Kroppssopplevelse og selvmordsatferd

Ved Israel Orbach

Hvilken rolle spiller kroppssopplevelser og kroppslige erfaringer for selvestruktiv atferd?

I denne artikkelen tas det utgangspunkt i at prosesser som gjelder tidlig ivaretaking av barnet, spiller en sentral rolle i utvikling av selvestruksjon gjennom endringer i kroppssopplevelse og negative holdninger til kroppen. Internalisering av tidlige negative omsorgsprosesser og negativ tilknytning kan føre til en forvrengt kroppssopplevelse og grunnleggende negative holdninger og følelser overfor egen kropp. Slike kroppssopplevelser og holdninger interagerer trolig med smerte, håpløshet og økende stress, og kan ende i selvestruksjon.

Mange faktorer har betydning for selvmord og selvmordsatferd. Vi kjenner minst 8 slike faktorer: mental tilstand, fenomenologisk tilstand, selvestruktive prosesser, personlighetstrekk, stress, forhold som fremmer eller hemmer selvmordsatferd, bakgrunnsfaktorer og symptomatferd (Orbach 1997). Her vil jeg avgrense meg til å fokusere på faktorer som fremmer selvmordsatferd.

Faktorer som fremmer selvmord er ikke årsak til selvmord, men kan svekke ytre eller indre stengsler mot selvmordsatferd, og gjennom dette øke sannsynligheten for at en person velger selvmord i stedet for andre måter å mestre psykisk smerte på. Forhold som fremmer selvmordsatferd, omfatter det å oppleve selvmord i omgivelsene, våpentilgjengelighet, kulturelle normer, tiltrekning til død og dissosiative reaksjoner, slik som avspaltning fra og likegyldighet i forhold til egen kropp.

Hypotesen som framsettes her, er at selvestruktiv atferd kan føres tilbake til tidlig fysisk tilknytning mellom barn og foreldre og til omsorgsprosesser. Tidlige positive omsorgsprosesser handler om tidlig samhandling mellom barn og for-

eldre, som er karakterisert ved en grunnleggende fysisk og emosjonell oppmerksomhet overfor barnets behov for fysisk tilknytning; å bli berørt, innhyllet og holdt fysisk. Den ekstreme motsetningen til en slik positiv fysisk tilknytning er omsorgssvikt, mishandling, skade og traumer. Slike erfaringer kan seinere i livet fremme selvestruktiv atferd (Briere 1989).

De to ekstreme formene for foreldretilknytning og omsorgsatferd blir internalisert av barnet som kroppslige hukommelsesser, og resulterer etter hvert i stabile kroppssopplevelser og -holdninger (Van der Velde 1985).

Min grunnleggende påstand er at negativ erfaring med tidlige omsorgsprosesser er en viktig faktor i utvikling av selvestruktiv atferd, fordi dette etter hvert påvirker kvalitet og grad av personlig følelsesmessig involvering når det gjelder beskyttelse av egen kropp og bevaring av eget liv. Negative omsorgsprosesser kan føre til forvrengt kroppssopplevelse og negative holdninger til kroppen. Når slike tilstander samvirker med andre prosesser, slik som sinne eller stress, kan de lette utviklingen av, men ikke være årsak til, selvestruktiv atferd. I fravær av naturlige beskyttende faktorer kan selvmordsatferd lettere bli resultatet enn når selvbeskyttende holdninger til kroppen er til stede.

Selvord og kroppen - empiriske data

Det foreligger empiriske data som viser forbindelse mellom tidlig omsorg, holdninger til kroppen og selvestruksjon. Salk (1985) fant i en postmortem-studie at tre faktorer skilte signifikant mellom ungdom som hadde tatt livet sitt, sammenlikna med to kontrollgrupper. I den første gruppa var det betydelig mer hyppig med dårlig kvalitet på svangerskapskontrollen, kronisk sjukdom hos mor og pustebesvær hos barnet etter fødselen. En måte

å forstå dette på, som også Salk foreslo, er at medisinsk neglisjering under svangerskapet fremmer avvising fra mor overfor barnet både før og etter at barnet er født.

Green (1978) studerte hvilken virkning omsorgssvikt og overgrep har på selvestruktiv atferd hos små barn. Han fant at selvestruktiv atferd (biting, kutting, brenne seg selv, trekke ut hår, dunke hodet mot veggen og selvmordsforsøk) var langt hyppigere blant barn som hadde vært utsatt for omsorgssvikt og overgrep sammenlikna med normale barn. Lester (1991) rapporterte en sammenheng mellom fysiske overgrep eller fysisk straff i barnealder og seinere økt frekvens av selvmordsforsøk i ei gruppe personer i fengsel. Disse hadde også vært lenger i mors liv under svangerskapet og hadde i kortere periode fått bryst. En undersøkelse nylig utført av Orbach et al. (1995) påviser negative holdninger til kroppen hos suicidale og ikke-suicidale ungdommer. De suicidale ungdommene opplevde større diskrepans mellom faktiske og ideelle kroppstrekk, mer negative følelser i forhold til kroppen og større grad av kroppslig dissosiasjon. En rekke korrelasjoner viste at jo større suicidal tendens, desto høyere grad av dissosiasjon, og jo større diskrepans, desto sterkere negative følelser i forhold til kroppen.

I en annen studie (Orbach & Mikulincer 1996) fant vi at suicidale ungdommer hadde en tendens til i mindre grad å ta vare på kroppen og beskytte seg, sammenlikna med ikke-suicidale sykehuspasienter og ei normal kontrollgruppe. Samtidig viste den suicidale gruppa større grad av kroppslig anhedoni og mer depresjon sammenlikna med de to kontrollgruppene. De suicidale pasientene opplyste at de opplevde mindre grad av varme og større grad av overbeskyttelse fra mor. Ivaretagelse og beskyttelse av egen kropp var negativt korrelert med suicidale tendenser.

Fysisk smerte og suicidalitet

Klarere empirisk støtte til den framsatte hypotesen fikk vi i flere studier som tok opp fysisk smertetoleranse hos suicidale ungdommer. Vi (Orbach et al. 1997) fant at suicidale ungdommer hadde en høyere smerteterskel og smertetoleranse sammenlikna med ei gruppe ikke-suicidale sykehuspasienter og ei normal kontrollgruppe. Videre korrelerte smertemålene signifikant med mål på suicidale tendenser, dissosiative tendenser og spesielt med håpløshet. Desto høyere suicidal tendens, dissosiering og håpløshet, desto høyere var toleransen for fysisk smerte.

I en annen undersøkelse (Orbach et al. 1996) fant vi at suicidale personer ikke bare tålte mer fysisk smerte sammenlikna med ei kontrollgruppe med personer som var skadet i ulykke. De to gruppene viste også forskjellig mønster i forholdet mellom fysisk smerte og indre stress. I den suicidale gruppa fant vi at jo mer negative følelser en person hadde til kroppen, jo mer vedkommende opplevde stress i livet og jo mer angst, desto høyere var også toleransen for fysisk smerte. I gruppa med personer som hadde vært utsatt for en ulykke, fant vi et omvendt forhold. Begge gruppene blei oppfatta å være under akutt stress (ulykke, selvmordsforsøk). I gruppa som hadde vært utsatt for en ulykke, så det ut til at økende indre stress (dvs. opplevd stress, dårlig kroppsbilde, depresjon), mobiliserte kroppens selvbevaringskrefter ved å senke responsterskelen for ytre skadelige stimuli (kroppslig smerte) for å unngå videre skade. I den suicidale gruppa førte økende indre stress til heving av responsterskelen for ytre stimulering,

antakelig som en forsvarsmekanisme preget av avspaltning fra kroppen. Dette fører til at en lettere blir utsatt for videre skade og eventuelt selvdestruksjon. Jeg mener at slike data gir noe støtte til antakelsen at suicidale personer opplever kroppen forskjellig fra ikke-suicidale.

Selv mord og kroppen - teoretisk forståelse

Hvordan kan vi teoretisk forstå forholdet mellom kroppslig erfaring og suicidal atferd? Som Van der Velde vil jeg hevde at evnen til å være glad i sin egen kropp, fysisk egenomsorg og selvbeskyttelse utvikles i spedbarnsalderen. Barnet forbinder de indre erfaringene av smerte, sult, tørst og fysisk velvære med ytre atferd, kroppsholdning og signaler fra omsorgsgiver (få mat, få skifta bleie, bli kjælt med), noe som igjen fører til endringer i kroppsopplevelse. Foreldrenes omsorgsatferd blir imitert og internalisert av barnet, og danner grunnlaget for hvordan barnet vil beskytte seg og ta vare på seg selv i framtida. Gjennom kjærlig foreldreomsorg lærer barnet at hans eller hennes kropp er verdifull, verdt å elske, og at livet er verdt å leve.

Å bli berørt er en livsoppretholdende kraft og et grunnleggende behov i tidlige utviklingsfaser. Harlow og medarbeidere (1959) viste empirisk behovet for sensorisk

stimulering og kontaktsøking for å få fysisk trøst. Små apeunger foretrakk alltid mjuke tøy mødre framfor harde ståltrådmødre som ga mat. Ainsworth et al. (1978) fant at spedbarn som blei holdt fysisk av mødre over lengre perioder, blei følelsesmessig tryggere sammenlikna med spedbarn som blei holdt av utålmodige mødre. Fysisk kontakt mellom mor og barn viste seg å være livreddende for spedbarn med lav fødselsvekt da "Kengurumor-teknik-

ken", som innebærer 24 timers hud-til-hud-kontakt, erstattet kuvøsebehandling. En undersøkelse viste at denne metoden var like effektiv som kuvøsebehandling når det gjaldt alvorlig sjukdom i en oppfølgingsperiode på seks måneder (Scholz & Samuels 1992). På samme måte fant Field et al. (1992) at barn og unge som var innlagt på sjukehus på grunn av psykiske problemer, slik som depresjon, atferdsforstyrrelser og suicidal atferd, hadde vært utsatt for fysisk mishandling eller lite berøring i tidlig barndom.

Spørsmålet som oppstår er: Hvilke prosesser forbinder kroppsopplevelse med selvdestruktiv atferd? Maltzberger (1993) ser en sammenheng mellom forstyrrelser i selvrepresentasjoner, sammenblanding av selvet og andre, intenst sinne og selvmordsatferd. I følge hans syn består selvet av representasjoner (introjekter) av stabile indre erfaringer og erfaringer med foreldrefigurer. En kjærlig og omsorgsfull foreldretilnærming blir en integrerende kraft som gradvis organiserer de ulike representasjonene inn i et sammenhengende selv.

Introjekter av personer, f.eks foreldre, som barnet hater kan ofte anta kroppslige representasjoner, som om den hatede personen metaforisk blir representert av kroppen. Denne prosessen er motivert av et ubevisst ønske om å eliminere eller ødelegge foreldrefiguren.

Furman (1984) mener at en finner utgangspunktet for suicidal atferd i tidlige sadomasochistiske forhold til omsorgsgiver. Introjisering av foreldrenes sadistiske tendenser kombinert med barnets egen aggresjon kan føre til en forvrengt oppfatning og erfaring av smerte og nytelse. Et slikt barn kan forveksle smerte og nytelse, og kan bruke selvpåført smerte som en måte å redusere trusselen om avstraffelse på.

Jeg vil foreslå dissosiering som en annen mulig prosess som forbinder kroppsopplevelse og selvmordsatferd (se Orbach 1994). Kroppslig dissosiering antas å oppstå i forbindelse med uutholdelige omstendigheter tidlig i livet, slik som avvising, et sadomasochistisk forhold eller fysiske overgrep/misbruk. Slike erfaringer kan gi opphav til dissosiative prosesser som

forsvarsmekanisme. Etter hvert kan dissosiasjonen arte seg som avspaltning fra kroppen, nummenhet, likegyldighet i forhold til kroppen, og ufølsomhet overfor fysisk smerte. Dissosiering eller kroppslig avspaltning innebærer en fysiologisk prosess som høyner terskelen for kroppslige stimuli, som forsvar mot uventede traumer eller for å bringe påkjenninger til opphør. Dissosiering og likegyldighet overfor fysisk smerte kan øke risikoen for suicidal atferd under økende ytre eller indre stress, særlig når en person utvikler sterke følelser av håpløshet og depresjon. Distansering, apati, håpløshet og negative følelser til kroppen kan svekke motstandskraften mot selvmord etter hvert som en person opplever at han eller hun har mindre å tape når det gjelder å ha glede av sin kropp, ved å gjøre selvmord.

Et forsøk på integrering

Alle disse begrepsformuleringene innebærer en sammenheng mellom forstyrret omsorg for barnet, forvrengt kroppssopplevelse, holdninger til kroppen og selvdestruktiv atferd. Gjennom begrepsformuleringene foreslås det at foreldrenes holdninger til barnet, slik dette avspeiler seg i deres omsorgsatferd, blir internalisert av barnet som barnets negative holdninger til egen kropp. På samme måte kan tidlig omsorgsatferd påvirke den måten barnet, og seinere den voksne, opplever sin egen kropp på. Den måten en person opplever egen kropp på, kan også påvirke hans/

hennes holdning til kroppen; dårlig kroppsbilde, neglisjering av kroppen, likegyldighet til eller avvisning av kroppen. Alle begrepsformuleringene betrakter også den forvrengte kroppssopplevelsen som en defensiv tilbaketrekning fra en smertefull virkelighet. Under alvorlig stress og opplevelse av håpløshet kan endringer og fordreininger i kroppssopplevelse interagere med allerede eksisterende negative holdninger og kroppserfaringer, og bidra til selvdestruktiv atferd.

Hypotesen som framsettes her, innebærer ikke at kroppslige prosesser i seg selv er årsak til selvmord. Selvmord kan ikke forstås uten at det relateres til mental smerte. Det er mental smerte som setter den suicidal prosessen i bevegelse, men visse kroppslige erfaringer og holdninger til kroppen kan lette og påskynde selvdestruksjon. Når følelser, slik som håpløshet, kombineres med en eller annen form for endra kroppssopplevelse eller -holdning som beskrevet her, kan suicidalitet lettere omsettes til handling. Jeg tror at en økt forståelse av kroppens betydning for suicidal atferd kan være nyttig for å utvikle nye og bedre strategier i behandling og forebygging av suicidal atferd. Selv om kroppslige prosesser bare delvis forklarer utviklingen av suicidal atferd, kan økt forståelse av kroppens rolle når det gjelder selvmord, som Maltzberger (1993) også sier, bli en av de viktigste skritt på veien til studiet av og muligens også for behandlingen av selvdestruktiv atferd.

(Artikkelen er oversatt av Ingebjørg Hestetun.)

Litteratur

- Ainsworth MDS, Blehar MC, Waters E, Wall S. **Patterns of attachment: a psychological study of the Stranger situation.** Hillsdale, NJ: Erlbaum, 1978.
- Briere J. **Therapy for adults molested as children.** New York: Springer, 1989.
- Field T, Morrow C, Valdeon C, Larson S, Kuhn C, Schanberg S. **Massage reduces anxiety in child and adolescent psychiatric patients.** Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry 1992; 81: 125-31.
- Furman E. **Children's patterns in mourning the death of a loved one.** I Wass H, Corr, CA. (eds.): Childhood and death. Series in death education, aging, and health care. Washington, DC: Hemisphere Publishing, 1984: 185-203

Green AH. **Self-destructive behavior in battered children.** American Journal of Psychiatry 1978; 135: 579-81.

Harlow HF, Zimmerman RR. **Affectional responses in the infant monkey.** Science 1959; 130: 421-32

Lester D. **Physical abuse and physical punishment as precursors of suicidal behavior.** Stress Medicine 1991; 7: 255-71.

Maltzberger JT. **Confusion of the body, the self and others in suicidal states.** I: Leenaars AA, red. Suicidology: essays in honor of Edwin S Shneidman. Northvale, NJ: Jason Aronson, 1993.

Orbach I. **Dissociation, physical pain, and suicide: a hypothesis.** Suicide and Life-Threatening-Behavior 1994; 24:68-79.

Orbach I. **A taxonomy of factors related to suicidal behavior.** Clinical Psychology: Science and Practice 1997; 4: 208-24.

Orbach I, Lotem-Peleg M, Kedem P. **Attitudes toward the body in suicidal, depressed, and normal adolescents.** Suicide and Life-Threatening-Behavior 1995; 25(2): 211-221

Orbach I, Mikulincer M. **Body care, dissociation, and physical anhedonia in suicidal youngsters.** Ramat-Gan, Israel: Department of Psychology, Bar-Ilan University, 1996.

Orbach I, Mikulincer M, King R, Cohen D, Stein D. **Thresholds and tolerance of physical pain in suicidal and nonsuicidal adolescents.** Journal of Consulting and Clinical Psychology 1997; 64: 646-52.

Orbach I, Stein D, Palgi Y, Asherov J, Har-Even D, Elizur A. **Perception of physical pain in accident and suicide attempt patients: self-preservation vs. self-destruction.** Journal of Psychiatric Research 1996; 30: 307-20.

Salk L. **Relationship of maternal and prenatal condition to eventual adolescent suicide.** Lancet 1985; 16: 624-7.

Scholz K, Samuels C. **Neonatal bathing and massage interventions with fathers, behavioral effects 12 weeks after birth of the first baby: the Sunraysia Australia Intervention Project.** International Journal of Behavioral Development 1992; 15: 67-81.

Van der Velde CD. **Body image of one's self and of others: developmental and clinical significance.** American Journal of Psychiatry 1985; 142: 527-37.

Israel Orbach, PhD, er professor i psykologi ved Bar-Ilan-Universitetet i Israel. Han arbeider med forskning og behandling av selvmordsatferd hos barn, ungdom og voksne, og har gitt ut flere bøker og ca. 100 artikler. Han har grunnlagt "Israel Association for Suicide Prevention", og er nå dekan for "Graduate Studies" (master's level) ved Bar-Ilan.